

شایع ترین اشکال سرطان گردن رحم عبارتند از:

- سرطان بافت بصره ای یا سنگفرشی (Squamous cell carcinoma) - این سرطان از شایع ترین انواع سرطان گردن رحم است که حدود ۷۵٪ اشکال سرطان گردن رحم را تشکیل می دهد. این سرطان از یاخته های مفروش لایه سطحی گردن رحم شروع می شود و رشد نسبتاً آهسته ای دارد و اغلب ماهها بلکه سالها طول می کشد تا به بافتهای اندام های مجاور سرایت کند. بیشتر مبتلایان این نوع سرطان، زنان ۴۰ تا ۶۰ سال هستند.
- سرطان غدد مترشحه مخاطی (Adenocarcinoma) - این نوع سرطان گردن رحم معمولاً در زیر بافت پوششی گردن رحم رشد می کند و معمولاً بین سنین ۲۵ تا ۴۰ سالگی دیده می شود. همه انواع تغییرات یاخته های گردن رحم بدخیم (سرطانی) نیستند. در زنانی که یاخته های گردن رحم آنها دچار تغییرات غیر سرطانی شده اند اغلب نتیجه عفونت و یا تورم آن است که در اصطلاح آسیب شناسی به آن دیسپلازی (Dysplasia) گفته می شود.

دیسپلازی گردن رحم سرطان نیست اما اطلاعات بالینی و آماری آن را عامل مقدماتی برای سرطانی شدن گردن رحم تلقی می کنند. این تغییرات اغلب در سنین ۲۵ تا ۳۵ سالگی ظاهر می کند. یاخته های دیسپلازی گردن رحم از نظر شکل در زیر میکروسکوپ شبیه یاخته های سرطانی هستند ولی مانند یاخته های سرطانی مهاجم نیستند و به بافتهای مجاور آسیبی نمی رسانند.

علائم هشدار دهنده سرطان گردن رحم

- در مراحل ابتدایی هیچ نشانه ای ندارد
- خونریزی غیر طبیعی (خونریزی ممکن است در فاصله بین عادت ماهانه شروع و قطع شود)
- خونریزی هنگام معاینه پزشکی اندامهای تناسلی
- سختی، درد و یا خونریزی به هنگام نزدیکی
- عفونت های مکرر مهبل
- درد به هنگام ادرار
- طولانی شدن بیش از حد معمول عادت ماهانه و یا خونریزی بیش از حد
- ازدیاد ترشحات مهبل (زرد، بدبوی)
- درد کمر

در شرایطی که سرطان گردن رحم مهاجم و به دیگر اندامها گسترش یافته باشد علاوه بر نشانه های فوق علائمی مانند یبوست، مشاهده خون در ادرار، گرفتگی مجرای ادرار، باز شدن غیر طبیعی گردن رحم و کم خونی تظاهر می کند