


تست سرطان دهانه رحم یا پاپ اسمیر چیست ؟  
 قبل از نمونه گیری چه مسائلی باید رعایت شود ؟

## تست سرطان دهانه رحم یا پاپ اسمیر چیست ؟



پاپ اسمیر یکی از آسان ترین، کم درد ترین و حتی کم خرج ترین آزمایشها ای پزشکی است. در ایران امکانات انجام این آزمایش در اغلب نقاط کشور به طور وسیع وجود دارد، روزانه تعداد زیادی از متخصصان زنان و زایمان، ماماهای و حتی بعضی از پزشکان عمومی این آزمایش را در کلینیک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها انجام می دهند. آرام بخش ترین جواب آزمایش پاپ اسمیر منفی بودن آن است، در واقع در آزمایشات میکروسکوپیک سلولی یا سلول های غیر طبیعی و سرطان زا مشاهده نشود. این نمونه برداری خیلی راحت و بدون درد و بدون بیهوشی در مطب صورت می گیرد و نمونه سلولهای دهانه رحم با وسیله چوبی یا پلاستیک روی لام شیشه ای کشیده شده و ثابت میگردد. سپس برای رنگ آمیزی و بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه ارسال می گردد و متخصص پاتولوژی یا سلول شناس آن را بررسی می کند.

در این بررسی ها تغییرات قبل از بدحیمی، علائم عفونت با ویروس پاپیلوما و تغییرات بدحیمی واضح و پیش رفته دهانه رحم دیده می شود. علاوه بر آن عفونت های دهانه رحم و واژن مهبل (مثل کاندیدا، تریکومونا، کوکوباسیل و ...) نیز خود را نشان می دهند. گاهی نیز علائم بدحیمی در سایر قسمت های تناسلی زنان مثل رحم، واژن و لوله های هم مشخص می شود.

## قبل از نمونه گیری چه مسائلی باید رعایت شود ؟

بهتر است نمونه گیری در زمان قاعدگی یا زمانی که ترشحات خیلی زیاد هستند و عفونت خیلی واضحی وجود دارد صورت نگیرد.

• قبل از نمونه گیری نباید به مدت ۴۸ ساعت نزدیکی صورت گرفته باشد

• از پمادهای داخل واژن یک هفتگه قبل از نمونه گیری استفاده نشده باشد.

انجام این آزمایش برای کلیه خانم هایی که فعالیت جنسی دارند یا داشته اند در تمامی سنین الزامی است و باید در ابتدای شروع فعالیت جنسی در سه سال اول، هر سال یکبار و بعد در صورتی که آزمایش طبیعی باشد هر ۳ سال یکبار انجام شود. البته گاهی اوقات با توجه به تغییرات خاص یا عفونت ها، پزشک متخصص زنان تشخیص می دهد که این فواصل کمتر شود و پس از درمان نیز با یک آزمایش دیگر نتایج درمان بررسی شود.